

PRESPIITAL

II Masuri de siguranta personala - casca +/- lanterna

- manusi

III Cu ce cobori din masina

I Oprirea accidentului: - unde opreste ambulanta - cand e prima resursa

- cand e a doua resursa

Semnalizarea locului accidentului

Siguranta salvatorilor

EVALUAREA PRIMARA

Constienta - avpu + Glasgow

A - cai aeriene - imobilizare cand, cum

- deschidere cai aeriene

- dezobstructie

- aspirare

- mentinere cai deschise - cu ce, cand

- oxigen - dispozitiv, debit

B - respiratia - prezenta cand se verifica, cum

- frecventa

- amplitudine

- zgomote supraadaugate audibile

- patern respirator particular

- leziuni rapid letale - asimetria miscarilor respiratorii +atitudine

- inspectia regiunii cervicale anterioare +atitudine

- miscari paradoxale +atitudine

- plagi toracic e penetrante +atitudine

Indicatii de iot

1. trasa - circulator
- respirator

2. Monitor defib

3. Aspirator

4. Oxigen

5. Terga lopata

6. Guler cervical

7. ^{KED}
Atele

8. injectomat

Secventa de inductie rapida

Metode de rezerva

c. circulatie - puls periferic - prez, frecventa amplitudine
- sangerare activa importanta si atitudine - se opreste - de prima
intentie

4. prezenta puls central - cand se verifica

- prezenta puls periferic

- frecventa

- amplitudine si aproximarea TA

Atitudine - 2 linii venoase unde, calibru, variante

Solutii - ce, caracteristici

- debit

- cat

Daca are pev verifica functionalitatea

MONITORIZAREA

- parametri: ritm, AV, sO2, TA, FR,

- valori normale- semnificatie valori patologice

- limite determinari parametri: parazitare EKG miscare, convulsii

Dezlipire electrozi

Pacient transpirat, pilozitate

Determinarea sO2 la periferie inchisa, frig

Determinarea sO2 la lumina puternica

Informatii din curba pulsului

Manseta prea mare sau prea mica

Arsuri torace si membre superioare

D. GCS, pupile, glicemie

extractie pacient locatii dificile / Imobilizare pacient pe targa Fixare pacient

EXAMINARE SECUNDARA

cristalozai - in HTA a/l
apoi caloziti

Analgezicizare

- 1 $\mu\text{g/kg}$ - Fentanyl
- 0,05 μg - Midazolam.
(3-4 μg).

Doze menținere inducte = $1/2$ din doza de inductie / ora

Curarizare - menținere cu Esmeron sau Rocuron
($1/2$ din doza de curarizare)

- menținerea se face la cerere - se poate adm în bolus. - din doze calculate pt intubare.